

## Consentimiento Informado Testosterona o Testosterona con Implantes de Anastrozol: Masculino

Los pellets de testosterona (T) se han utilizado para la terapia hormonal desde 1940. T y otros "pellets" para la inserción están 'compuestos'. Se colocan debajo de la piel de la parte inferior del abdomen o área de "manija del amor" como un procedimiento ambulatorio bajo anestesia local. Pueden ocurrir complicaciones y pueden incluir extrusión del pellet, sangrado, hematomas, cicatrices o infección. Los pellets se disuelven por completo y no son extraíbles. Los efectos secundarios de la terapia (T) pueden incluir un aumento en el vello facial y corporal, o acné. Efectos beneficiosos de (T) son dependientes de la dosis, pero parecen estancarse entre 1000 y 1400 ng/dl.

Los pellets administran (T) durante cuatro meses en promedio en los hombres. (T) estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos, que en casos ocasionales pueden elevar el recuento de glóbulos rojos y requerir una donación de sangre. Los niveles séricos de (T) en la terapia de implantes pueden ser superiores a los niveles "normales" para algunos rangos de referencia de laboratorio. Los síntomas suelen reaparecer cuando los niveles séricos se acercan al rango alto o medio normal. Su nivel de testosterona variará significativamente a lo largo del día con pellets como lo hicieron cuando era más joven con testículos que funcionan de manera óptima. La terapia de pellets (T) invierte el músculo (y posiblemente la pérdida ósea) asociado con el envejecimiento.

A pesar de los últimos artículos de noticias en sentido contrario, la mayoría de los estudios científicos bien hechos y reproducibles reportan un efecto beneficioso de la (T) en las enfermedades del corazón. Notifique a Sarah Roberson MSN, FNP-C antes del procedimiento si tiene antecedentes de cáncer de próstata. Se recomienda que su proveedor de atención primaria le haga un examen anual.

(T) es el sustrato principal o "bloque de construcción" para estrógenos. Los síntomas del exceso de estrógeno incluyen retención de líquidos, hinchazón, ansiedad, irritabilidad, dolor de mama o aumento de peso. Un bloqueador de estrógenos, anastrozol, se puede combinar con (T) en el implante compuesto si convierte demasiada (T) en estrógeno. La inclusión de anastrozol en pellets (T) es un uso 'fuera de etiqueta' de anastrozol.

- Se recomienda que usted tiene un examen de próstata negativo y PSA normal antes de la terapia. Si Sarah no es su proveedor de atención primaria, es su responsabilidad notificarle sobre cualquier cambio en esto antes de la inserción de pellets.
- No hay actividad física vigorosa durante 5 días después del procedimiento. Levantamiento de pesas y caminar se permiten 48 horas después de la inserción. Sin inmersión en agua durante 5 días.
- Puede quitar el aderezo seco y ducharse el día después de la inserción. Deje las cintas para la piel en su lugar.
- Debe notificar al médico cualquier alergia o problema de sangrado antes del procedimiento, incluyendo terapia anticoagulante (es decir, Coumadin, Plavix) o aspirina. El riesgo de sangrado aumenta con estos.
- Si corresponde, debe notificar a su oncólogo antes de que se coloquen los pellets de T o T + anastrozol.

**He leído y entiendo la información anterior. Entiendo el procedimiento, beneficios, riesgos, efectos secundarios y alternativas a la 'Implantación de pellets hormonales'. Entiendo que la testosterona-Anastrozol combinación pellets no están aprobados por la FDA. Estoy de acuerdo en permitir que Sarah Roberson, MSN, FNP-C implante los pellets. Entiendo que Sarah no asumirá el papel de mi proveedor de atención médica primaria a menos que ella y yo hayamos acordado mutuamente que ella lo haga. Acepto mantener inofensivos a Complete Integrative Care y a sus proveedores por cualquier complicación que pueda ocurrir. Soy consciente de que el pellet real y la inserción del pellet no es un servicio cubierto por mi seguro y que seré responsable de pagar la tarifa completa en el momento del registro para mi inserción de pellets.**

\_\_\_\_\_  
Testigo

\_\_\_\_\_  
Firma de Paciente

\_\_\_\_\_  
Fecha

\_\_\_\_\_  
Fecha de Nacimiento

\*De uso de etiqueta f: of, relacionado con, o ser un medicamento aprobado legalmente prescrito por un médico para un propósito para el que no ha sido aprobado específicamente.

Abreviatura: T (testosterona)